

## CLÉ DE CORRECTION À L'INTENTION DU PERSONNEL ENSEIGNANT – TOUT LE MONDE LE FAIT. N'EST-CE PAS?

1. En 1996, 32 % des jeunes Canadien-nes de 15 à 17 ans avaient eu des relations sexuelles au moins une fois. Selon toi, quel était ce pourcentage en 2010?  
30 % (Rotterman, 2008 & 2012)
2. En 1996, 70 % des jeunes Canadien-nes de 18 à 19 ans avaient eu des relations sexuelles au moins une fois. Selon toi, quel était ce taux en 2010?  
68 % (Rotterman, 2008 & 2012)
3. En 2003, le taux de grossesse à Calgary, Alberta, était de 32,6 sur 1 000 (3,26 %). Selon toi, quel était ce taux en 2012?  
12,5 sur 1 000 (Alberta Health Service, 2013)
4. En 1995, le taux de grossesse chez les 15 à 19 ans dans l'ensemble du Canada était de 47,6 sur 1 000 (4,76 %). Selon toi, quel était ce taux en 2005?  
29,2 sur 1 000 (SIECCAN, 2009)
5. Complète la phrase : En 2007, une étude a révélé que l'éducation sur la santé sexuelle à l'école \_\_\_\_\_ les comportements sexuels précoces chez les adolescent-es.  
**diminuait** (SIECCAN, 2009)
6. Complète la phrase : En 2007, une étude a révélé que l'éducation sur la santé sexuelle à l'école \_\_\_\_\_ l'utilisation du condom ou de la contraception chez les adolescent-es.  
**augmentait** (SIECCAN, 2009)
7. La pilule contraceptive d'urgence (« pilule du lendemain ») t'empêchera de devenir enceinte si tu ne l'es pas déjà. Au Canada (ailleurs qu'au Québec), que faut-il pour obtenir ce médicament si tu as plus de 18 ans?  
**Accès à une pharmacie qui offre le médicament**  
*Excepté au Québec, où il faut une ordonnance médicale pour accéder à la pilule contraceptive d'urgence. (Pour plus d'information, voir les modules 9.2, 9.3 et 9.4.)*
8. Au Canada, la chlamydia est l'ITSS la plus fréquemment déclarée chez les adolescent-es de 15 à 19 ans. En 2006, le taux de chlamydia chez les adolescent-es était de 837,9 sur 100 000 (0,84 %). Aujourd'hui, crois-tu que ce taux est...  
**Plus élevé** (ASPC, 2011)

